

Leidet auch Ihr Hund unter IBD/IGOR?

Sollten Sie mehr als vier Symptome bei Ihrem Hund feststellen, empfehlen wir Ihnen, den kostenlosen Onlinetest zu nutzen:

Kostenloser
Online-Test
unter
www.ibd-hund.de

- Heißhunger • Gewichtsverlust • Ängstlichkeit • schmerzhafter Kotdrang
- Unzugänglichkeit • auffallend laute Darmgeräusche • Schreckhaftigkeit
- immer wiederkehrende Durchfälle • Kot-/Grasfressen • gesteigerte Unruhe, auch nachts
- Kot oder Durchfall mit Blutauflagerungen • nächtlicher Kotdrang
- Kot mit Schleimbeimengungen oder -überzug • überwiegend kleine Kotmengen
- teils explosionsartige Kotentladung ohne große Absatzmenge • Aggressivität
- nächtliche Inkontinenz / Tröpfeln • manisches Benagen der eigenen Beine
- Sodbrennen • Teppichlecken • epileptiforme Anfälle • PICA-Syndrom
- immer wiederkehrende Attacken, die sich im Laufe der Zeit (Jahre) langsam steigern



Hier gibt es Hilfe:

Informieren Sie sich unter www.ibd-hund.de
und www.lupovet.de.

Yes, we canIBD!

Zielführende Puzzlesteine zur Behandlung der canIBD

Futter aus IBDerma-Linie

IBDerma Hyposens
(bei IGOR in Miniform)
IBDerma HappyChi
IBDerma VeggieSens
IBDerma Tapiovo Mini
(mit Wasser)

Ergänzer von LupoVet

IGOReflux & IGORvegan
Inu-Tryptophan
Lup-Enterol
PropionArte
Boswellia-Serrata-65% BA

Nicht nur S²FERCKL² mag SM

S² wie Sauerkraut & Schaf
F wie Frisch!
E wie Essig
R wie Rote Beete
C wie Chicorée
K wie Kefir (o.a. Milchsauerprodukte)
L² wie Limburger Käse & Leber
S wie Saure Gurken
M wie Morosuppe

Medizinisches

nach tierärztlicher
Abstimmung

Psyche/ Soziales

Ruhe und
Ausgeglichenheit
Stabiles Umfeld
Vertrauen und
Freiraum

Belohnung/ Akzeptanz

Geeignete Snacks
von LupoVet
IBDerma Tapiovo Mini
Reinfleischdosen/
Frischebeutel von LupoVet

Individualisierbarer Behandlungsplan der canIBD

Alleinfuttermittel IBDerma (Hyposens, Happy Chi, VeggieSens, Tapiovo)

(je nach Zielgewichtsdifferenz) jeweils 1,2-1,5-2% des Zielgewichts im Visier, verteilt (auf 3-4 x täglich), mit 2-3facher Menge lauwarmen Wassers / Gemüsebrühe übergossen

Gewicht des Hundes:

Ergänzer*	Dosis:	bis 10kg	10-30kg	über 30kg
IGOReflux bzw. IGORvegan	3-5x täglich	ca. 1,5g	2 - 4g	4 - 6g
Alternativen:				
IGOR Kau-Kaps	3-5x täglich	1 Kps.	1-3 Kps.	3-6 Kps.
IGORefluTabs 450mg	3-5x täglich	bis 3 Tabl.	3-9 Tabl.	
IGOReflux Peletten	3-5x täglich	bis zu 1,5g	2 - 4g	4 - 6g
Inu-Tryptophan	2x täglich	½Kps.	½-1Kps.	1Kps.
Lup-Enterol	2-3x täglich	1 gestr. TL	1TL	1EL
Boswellia-Serrata-65% BA	3 x täglich	½-1Kps.	1-2Kps.	2-3Kps.
PropionArte	2 x täglich	½-1Kps.	1-2Kps.	2-3Kps.

ins Futter geben, ideal vor den Mahlzeiten und abends vor dem Schlafen, situativ auch nachts. Pur als Leckerli, mit frischem Sauerkraut / Krautsalat vermischt oder in etwas reifem Rotstreichkäse (z.B. Limburger, Münster, ...), nach Belieben.

(möglichst außerhalb der Hauptmahlzeiten)

* Wichtiger Hinweis: Jeder Hund ist anders, daher sollten auch die Ergnzer individualisiert angepasst werden.

Medikamente (situativ, nach tierrztlicher Beratung)

Budesonid 3mg Hartkapseln	1x morgens	60 – 150Kgl.	ca. ½Hkps.	ca. ½-1Hkps.
Sulfasalazin (ggf. mrsern)	3x tglich	½12Tabl.	½6Tabl.	¼4- ½Tabl.

Hinweis: in knapp 1 % der Flle besteht das Risiko einer zunchst reversiblen KCS (Keratoconjunctivitis sicca).

Diese tritt, wenn berhaupt, in den ersten 3 Wochen nach Gabe von Sulfasalazin auf. Dosis ggf. anpassen oder absetzen.

Weiteres

Appetizer und Snacks

Freiland-Ziege (Frischebeutel, Dose) zur Akzeptanzsteigerung, max. 10% der Gesamttagesration, IBDerma Tapiovo Mini, spezielle Snacks bei IBD/IGOR von LupoVet

Zustzlich: „Nicht nur S²FERCKL² mag SM-System“

S ² wie Sauerkraut und Schaf	Frisches, ungekochtes Sauerkraut oder Krautsalat einschleichend bis zu 1% des KG (Krpergewichtes) Schaf-Spare-Rips (Rippen mit Muskulatur/Knorpel, frisch, kurz mit kochendem Wasser entkeimt)
F wie Frisch!	zum Erhalt der wertvollen Bestandteile
E wie Essig	Bis zu 3 x 1 EL Essig pro Tag dem Hund hinzufttern.
R wie Rote Beete	aus dem Glas incl. Sud
C wie Chicore	gednstet oder roh, bis zu 1% des Krpergewichtes
K wie Kefir	Milchsauerprodukte versuchen, auch Naturjoghurt, bis zu 3 EL. pro Tag
L ² wie Limburger und Leber	Wiederholte Gabe von Rotschmierksearten wie reifem Limburger / Mnster-Kse (dauerhaft 2 x 5 g pro 10 kg KG tglich, bei 30-40 kg (2 x 10 g). Leber (vom Rind) ist eine hervorragende Vitamin B-Quelle, hin und wieder ein Stckchen geben, vorher zwecks Hygiene kurz mit heiem Wasser bergieen.
S wie Saure Gurken	als Laktobazillus-/Laktatquelle
M wie Morosuppe	zwischen durch Esslffelweise

1000FACH
GETESTET, ES
FUNKTIONIERT
EINFACH!

